ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน
พาราเซตามอลชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม

1. ขนาดยาในผู้ใหญ่ ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 4,000 มก. (8 เม็ด) ใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด และยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอลชนิดน้ำ

1. ขนาดยาในเด็ก ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชั่วโมง (สูงสุด 3,250 มก./24 ชั่วโมง)
2. เด็กไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาน้ำบรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ ชนิดที่เป็นยาผสม
5. อย่านำยาของเด็กโตไปป้อนให้เด็กเล็ก

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอลชนิดน้ำ

1. ขนาดยาในเด็ก ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชั่วโมง (สูงสุด 3,250 มก./24 ชั่วโมง)
2. เด็กไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาน้ำบรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ ชนิดที่เป็นยาผสม
5. อย่านำยาของเด็กโตไปป้อนให้เด็กเล็ก

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอลชนิดน้ำ

1. ขนาดยาในเด็ก ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชั่วโมง (สูงสุด 3,250 มก./24 ชั่วโมง)
2. เด็กไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาน้ำบรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ ชนิดที่เป็นยาผสม
5. อย่านำยาของเด็กโตไปป้อนให้เด็กเล็ก

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอลชนิดน้ำ

1. ขนาดยาในเด็ก ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชั่วโมง (สูงสุด 3,250 มก./24 ชั่วโมง)
2. เด็กไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาน้ำบรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ ชนิดที่เป็นยาผสม
5. อย่านำยาของเด็กโตไปป้อนให้เด็กเล็ก

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอลชนิดน้ำ

1. ขนาดยาในเด็ก ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชั่วโมง (สูงสุด 3,250 มก./24 ชั่วโมง)
2. เด็กไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาน้ำบรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ ชนิดที่เป็นยาผสม
5. อย่านำยาของเด็กโตไปป้อนให้เด็กเล็ก

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอลชนิดน้ำ

1. ขนาดยาในเด็ก ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชั่วโมง (สูงสุด 3,250 มก./24 ชั่วโมง)
2. เด็กไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาน้ำบรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ ชนิดที่เป็นยาผสม
5. อย่านำยาของเด็กโตไปป้อนให้เด็กเล็ก

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอลชนิดน้ำ

1. ขนาดยาในเด็ก ไม่เกิน 15 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,000 มก.) และไม่เกิน 75 มก./กก./24 ชั่วโมง (สูงสุด 3,250 มก./24 ชั่วโมง)
2. เด็กไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน โดยไม่ปรึกษาแพทย์
3. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
4. โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอลจากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาน้ำบรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ ชนิดที่เป็นยาผสม
5. อย่านำยาของเด็กโตไปป้อนให้เด็กเล็ก

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอล + ออเฟนาดรีน

1. ระวังการได้รับพาราเซตามอลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เพราะจะได้รับพาราเซตามอลอย่างซ้ำซ้อน จนได้รับยาเกินขนาด
2. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
3. ยานี้อาจทำให้ง่วง จึงต้องระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และไม่กินร่วมกับแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน และความจำเลอะเลือน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอล + ออเฟนาดรีน

1. ระวังการได้รับพาราเซตามอลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เพราะจะได้รับพาราเซตามอลอย่างซ้ำซ้อน จนได้รับยาเกินขนาด
2. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
3. ยานี้อาจทำให้ง่วง จึงต้องระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และไม่กินร่วมกับแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน และความจำเลอะเลือน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอล + ออเฟนาดรีน

1. ระวังการได้รับพาราเซตามอลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เพราะจะได้รับพาราเซตามอลอย่างซ้ำซ้อน จนได้รับยาเกินขนาด
2. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
3. ยานี้อาจทำให้ง่วง จึงต้องระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และไม่กินร่วมกับแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน และความจำเลอะเลือน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอล + ออเฟนาดรีน

1. ระวังการได้รับพาราเซตามอลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เพราะจะได้รับพาราเซตามอลอย่างซ้ำซ้อน จนได้รับยาเกินขนาด
2. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
3. ยานี้อาจทำให้ง่วง จึงต้องระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และไม่กินร่วมกับแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน และความจำเลอะเลือน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอล + ออเฟนาดรีน

1. ระวังการได้รับพาราเซตามอลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เพราะจะได้รับพาราเซตามอลอย่างซ้ำซ้อน จนได้รับยาเกินขนาด
2. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
3. ยานี้อาจทำให้ง่วง จึงต้องระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และไม่กินร่วมกับแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน และความจำเลอะเลือน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน พาราเซตามอล + ออเฟนาดรีน

1. ระวังการได้รับพาราเซตามอลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เพราะจะได้รับพาราเซตามอลอย่างซ้ำซ้อน จนได้รับยาเกินขนาด
2. การใช้พาราเซตามอลเกินขนาด อาจทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย นำไปสู่ภาวะตับวายและการเสียชีวิตได้
3. ยานี้อาจทำให้ง่วง จึงต้องระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะหรือการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และไม่กินร่วมกับแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือผู้สูงอายุ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตก หกล้ม ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก สับสน และความจำเลอะเลือน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด

1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้รุนแรงที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวม และความดันเลือดสูงขึ้น

3 ไม่ควรใช้ไอบูโพรเฟนร่วมกับแอสไพริน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด

1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้รุนแรงที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวม และความดันเลือดสูงขึ้น

3 ไม่ควรใช้ไอบูโพรเฟนร่วมกับแอสไพริน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด

1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้รุนแรงที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวม และความดันเลือดสูงขึ้น

3 ไม่ควรใช้ไอบูโพรเฟนร่วมกับแอสไพริน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด

1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้รุนแรงที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวม และความดันเลือดสูงขึ้น

3 ไม่ควรใช้ไอบูโพรเฟนร่วมกับแอสไพริน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด

1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้รุนแรงที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวม และความดันเลือดสูงขึ้น

3 ไม่ควรใช้ไอบูโพรเฟนร่วมกับแอสไพริน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด

1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้รุนแรงที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวม และความดันเลือดสูงขึ้น

3 ไม่ควรใช้ไอบูโพรเฟนร่วมกับแอสไพริน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดเม็ด

1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน

2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดยาต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกจากทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจหรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้รุนแรงที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวม และความดันเลือดสูงขึ้น

3 ไม่ควรใช้ไอบูโพรเฟนร่วมกับแอสไพริน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น
2. ควรใช้พาราเซตามอลเป็นยาขนานแรกในการลดไข้ แก้ปวด ในเด็ก
3. ใช้ยานี้ร่วมกับพาราเซตามอลได้
4. ใช้ยาให้ถูกขนาดตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
5. หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้ หรือยังไม่หายปวด ควรกลับไปพบแพทย์
6. กรณีสงสัยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น
2. ควรใช้พาราเซตามอลเป็นยาขนานแรกในการลดไข้ แก้ปวด ในเด็ก
3. ใช้ยานี้ร่วมกับพาราเซตามอลได้
4. ใช้ยาให้ถูกขนาดตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
5. หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้ หรือยังไม่หายปวด ควรกลับไปพบแพทย์
6. กรณีสงสัยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น
2. ควรใช้พาราเซตามอลเป็นยาขนานแรกในการลดไข้ แก้ปวด ในเด็ก
3. ใช้ยานี้ร่วมกับพาราเซตามอลได้
4. ใช้ยาให้ถูกขนาดตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
5. หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้ หรือยังไม่หายปวด ควรกลับไปพบแพทย์
6. กรณีสงสัยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น
2. ควรใช้พาราเซตามอลเป็นยาขนานแรกในการลดไข้ แก้ปวด ในเด็ก
3. ใช้ยานี้ร่วมกับพาราเซตามอลได้
4. ใช้ยาให้ถูกขนาดตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
5. หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้ หรือยังไม่หายปวด ควรกลับไปพบแพทย์
6. กรณีสงสัยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น
2. ควรใช้พาราเซตามอลเป็นยาขนานแรกในการลดไข้ แก้ปวด ในเด็ก
3. ใช้ยานี้ร่วมกับพาราเซตามอลได้
4. ใช้ยาให้ถูกขนาดตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
5. หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้ หรือยังไม่หายปวด ควรกลับไปพบแพทย์
6. กรณีสงสัยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น
2. ควรใช้พาราเซตามอลเป็นยาขนานแรกในการลดไข้ แก้ปวด ในเด็ก
3. ใช้ยานี้ร่วมกับพาราเซตามอลได้
4. ใช้ยาให้ถูกขนาดตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
5. หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้ หรือยังไม่หายปวด ควรกลับไปพบแพทย์
6. กรณีสงสัยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น
2. ควรใช้พาราเซตามอลเป็นยาขนานแรกในการลดไข้ แก้ปวด ในเด็ก
3. ใช้ยานี้ร่วมกับพาราเซตามอลได้
4. ใช้ยาให้ถูกขนาดตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
5. หลังใช้ยา 3 วัน ถ้ายังมีไข้ หรือยังไม่หายปวด ควรกลับไปพบแพทย์
6. กรณีสงสัยเป็นไข้เลือดออก ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้มีเลือดออกอย่างรุนแรงได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ลอราทาดีน/เซททิริซิน

1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคมีสาเหตุจากการแพ้ หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ใช้ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้ หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น

2 ยานี้ไม่ช่วยลดน้ำมูกในผู้ที่มีน้ำมูกไหลจากโรคหวัด ไอ เจ็บคอ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีสาเหตุจากการแพ้ การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง เช่น คลอเฟนนิรามีน อาจบรรเทาอาการได้บ้างในผู้ป่วยบางราย

3 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาลดน้ำมูก” เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ลอราทาดีน/เซททิริซิน

1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคมีสาเหตุจากการแพ้ หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ใช้ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้ หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น

2 ยานี้ไม่ช่วยลดน้ำมูกในผู้ที่มีน้ำมูกไหลจากโรคหวัด ไอ เจ็บคอ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีสาเหตุจากการแพ้ การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง เช่น คลอเฟนนิรามีน อาจบรรเทาอาการได้บ้างในผู้ป่วยบางราย

3 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาลดน้ำมูก” เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ลอราทาดีน/เซททิริซิน

1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคมีสาเหตุจากการแพ้ หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ใช้ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้ หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น

2 ยานี้ไม่ช่วยลดน้ำมูกในผู้ที่มีน้ำมูกไหลจากโรคหวัด ไอ เจ็บคอ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีสาเหตุจากการแพ้ การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง เช่น คลอเฟนนิรามีน อาจบรรเทาอาการได้บ้างในผู้ป่วยบางราย

3 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาลดน้ำมูก” เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ลอราทาดีน/เซททิริซิน

1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคมีสาเหตุจากการแพ้ หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ใช้ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้ หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น

2 ยานี้ไม่ช่วยลดน้ำมูกในผู้ที่มีน้ำมูกไหลจากโรคหวัด ไอ เจ็บคอ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีสาเหตุจากการแพ้ การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง เช่น คลอเฟนนิรามีน อาจบรรเทาอาการได้บ้างในผู้ป่วยบางราย

3 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาลดน้ำมูก” เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ลอราทาดีน/เซททิริซิน

1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคมีสาเหตุจากการแพ้ หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ใช้ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้ หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น

2 ยานี้ไม่ช่วยลดน้ำมูกในผู้ที่มีน้ำมูกไหลจากโรคหวัด ไอ เจ็บคอ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีสาเหตุจากการแพ้ การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง เช่น คลอเฟนนิรามีน อาจบรรเทาอาการได้บ้างในผู้ป่วยบางราย

3 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาลดน้ำมูก” เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ลอราทาดีน/เซททิริซิน

1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดง่วงน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคมีสาเหตุจากการแพ้ หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ใช้ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้ หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น

2 ยานี้ไม่ช่วยลดน้ำมูกในผู้ที่มีน้ำมูกไหลจากโรคหวัด ไอ เจ็บคอ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีสาเหตุจากการแพ้ การใช้ยาแก้แพ้ชนิดง่วง เช่น คลอเฟนนิรามีน อาจบรรเทาอาการได้บ้างในผู้ป่วยบางราย

3 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาลดน้ำมูก” เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคไซนัสอักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. โรคไซนัสอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค
3. ผู้เป็นไซนัสอักเสบที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะคือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หรือมีอาการดีขึ้นในช่วง 5-6 วันแรก แต่กลับเป็นใหม่ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วัน
4. เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยา บางครั้งต้องใช้ยานี้ในขนาดสูงเป็นสองเท่าของขนาดยาปกติ
5. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคไซนัสอักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. โรคไซนัสอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค
3. ผู้เป็นไซนัสอักเสบที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะคือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หรือมีอาการดีขึ้นในช่วง 5-6 วันแรก แต่กลับเป็นใหม่ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วัน
4. เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยา บางครั้งต้องใช้ยานี้ในขนาดสูงเป็นสองเท่าของขนาดยาปกติ
5. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคไซนัสอักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. โรคไซนัสอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค
3. ผู้เป็นไซนัสอักเสบที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะคือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หรือมีอาการดีขึ้นในช่วง 5-6 วันแรก แต่กลับเป็นใหม่ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วัน
4. เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยา บางครั้งต้องใช้ยานี้ในขนาดสูงเป็นสองเท่าของขนาดยาปกติ
5. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคไซนัสอักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. โรคไซนัสอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค
3. ผู้เป็นไซนัสอักเสบที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะคือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หรือมีอาการดีขึ้นในช่วง 5-6 วันแรก แต่กลับเป็นใหม่ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วัน
4. เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยา บางครั้งต้องใช้ยานี้ในขนาดสูงเป็นสองเท่าของขนาดยาปกติ
5. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคไซนัสอักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. โรคไซนัสอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค
3. ผู้เป็นไซนัสอักเสบที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะคือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หรือมีอาการดีขึ้นในช่วง 5-6 วันแรก แต่กลับเป็นใหม่ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วัน
4. เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยา บางครั้งต้องใช้ยานี้ในขนาดสูงเป็นสองเท่าของขนาดยาปกติ
5. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคไซนัสอักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. โรคไซนัสอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค
3. ผู้เป็นไซนัสอักเสบที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะคือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หรือมีอาการดีขึ้นในช่วง 5-6 วันแรก แต่กลับเป็นใหม่ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วัน
4. เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยา บางครั้งต้องใช้ยานี้ในขนาดสูงเป็นสองเท่าของขนาดยาปกติ
5. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคไซนัสอักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. โรคไซนัสอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค
3. ผู้เป็นไซนัสอักเสบที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะคือ ผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หรือมีอาการดีขึ้นในช่วง 5-6 วันแรก แต่กลับเป็นใหม่ หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วัน
4. เนื่องจากปัญหาเชื้อดื้อยา บางครั้งต้องใช้ยานี้ในขนาดสูงเป็นสองเท่าของขนาดยาปกติ
5. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคคออักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”เพราะเป็นชื่อเรียกที่ผิด และไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
3. การรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว
4. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
5. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งดื้อต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง
6. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคคออักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”เพราะเป็นชื่อเรียกที่ผิด และไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
3. การรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว
4. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
5. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งดื้อต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง
6. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคคออักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”เพราะเป็นชื่อเรียกที่ผิด และไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
3. การรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว
4. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
5. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งดื้อต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง
6. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคคออักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”เพราะเป็นชื่อเรียกที่ผิด และไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
3. การรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว
4. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
5. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งดื้อต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง
6. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคคออักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”เพราะเป็นชื่อเรียกที่ผิด และไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
3. การรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว
4. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
5. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งดื้อต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง
6. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคคออักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”เพราะเป็นชื่อเรียกที่ผิด และไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
3. การรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว
4. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
5. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งดื้อต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง
6. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินในโรคคออักเสบ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”เพราะเป็นชื่อเรียกที่ผิด และไม่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
3. การรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้องใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว
4. โรคหวัด ไอ เจ็บคอ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
5. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อทำให้แบคทีเรียดื้อยา ทั้งดื้อต่อยานี้และยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อติดเชื้อขั้นรุนแรง
6. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. การมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งใช้ยานี้รักษาไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์
3. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาได้ยากจนอาจไม่มียาใช้ในที่สุด
4. การใช้ยานี้โดยไม่จำเป็นเพิ่มความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา เช่น อาการท้องร่วง หรืออาจแพ้ขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. การมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งใช้ยานี้รักษาไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์
3. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาได้ยากจนอาจไม่มียาใช้ในที่สุด
4. การใช้ยานี้โดยไม่จำเป็นเพิ่มความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา เช่น อาการท้องร่วง หรืออาจแพ้ขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. การมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งใช้ยานี้รักษาไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์
3. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาได้ยากจนอาจไม่มียาใช้ในที่สุด
4. การใช้ยานี้โดยไม่จำเป็นเพิ่มความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา เช่น อาการท้องร่วง หรืออาจแพ้ขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. การมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งใช้ยานี้รักษาไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์
3. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาได้ยากจนอาจไม่มียาใช้ในที่สุด
4. การใช้ยานี้โดยไม่จำเป็นเพิ่มความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา เช่น อาการท้องร่วง หรืออาจแพ้ขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. การมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งใช้ยานี้รักษาไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์
3. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาได้ยากจนอาจไม่มียาใช้ในที่สุด
4. การใช้ยานี้โดยไม่จำเป็นเพิ่มความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา เช่น อาการท้องร่วง หรืออาจแพ้ขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. การมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งใช้ยานี้รักษาไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์
3. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาได้ยากจนอาจไม่มียาใช้ในที่สุด
4. การใช้ยานี้โดยไม่จำเป็นเพิ่มความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา เช่น อาการท้องร่วง หรืออาจแพ้ขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อะมอกซิซิลลินชนิดน้ำ

1. ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
2. การมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในเด็กส่วนใหญ่ มากกว่า 8 ใน 10 ครั้ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งใช้ยานี้รักษาไม่ได้ แต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรค อาการเหล่านี้อาจเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์
3. การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อนำไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาได้ยากจนอาจไม่มียาใช้ในที่สุด
4. การใช้ยานี้โดยไม่จำเป็นเพิ่มความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา เช่น อาการท้องร่วง หรืออาจแพ้ขั้นรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดเม็ด

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ด/ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 เม็ด/วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดเม็ด

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ด/ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 เม็ด/วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดเม็ด

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ด/ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 เม็ด/วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดเม็ด

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ด/ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 เม็ด/วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดเม็ด

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ด/ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 เม็ด/วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดเม็ด

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ด/ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 เม็ด/วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดเม็ด

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 1 เม็ด/ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 3 เม็ด/วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ดอมเพอริโดนชนิดน้ำ

1. ยานี้อาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากใช้เกินขนาด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้กับผู้ที่มีการทำงานของตับลดลงในระดับปานกลางถึงมาก ผู้มีจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาที่ส่งผลเสียต่อจังหวะการเต้นของหัวใจหรือใช้ร่วมกับยาที่ทำให้ระดับดอมเพอริโดนสูงขึ้นในเลือดซึ่งมีอยู่หลายชนิด
2. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.25 มก./กก./ครั้ง
3. ไม่ควรใช้ยานี้เกิน 0.75 มก./กก./วัน
4. ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน
5. ระมัดระวังเป็นพิเศษกับผู้มีการทำงานของไตลดลง

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อีนาลาพริล

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้มีอาการไอเรื้อรัง ลักษณะไอแบบแห้ง ๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอหรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอจะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองเพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ามีอาการไอ เพื่อทำการวินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน
3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ช่วงไตรมาส 2, 3

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน แอมโลดิปีน เลอร์คานิดิปีน มานิดิปีน

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
3. เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดยาเอง
4. ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน แอมโลดิปีน เลอร์คานิดิปีน มานิดิปีน

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
3. เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดยาเอง
4. ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน แอมโลดิปีน เลอร์คานิดิปีน มานิดิปีน

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
3. เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดยาเอง
4. ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน แอมโลดิปีน เลอร์คานิดิปีน มานิดิปีน

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
3. เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดยาเอง
4. ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน แอมโลดิปีน เลอร์คานิดิปีน มานิดิปีน

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
3. เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดยาเอง
4. ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน แอมโลดิปีน เลอร์คานิดิปีน มานิดิปีน

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
3. เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดยาเอง
4. ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน แอมโลดิปีน เลอร์คานิดิปีน มานิดิปีน

1. แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
3. เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ไม่ควรหยุดยาเอง
4. ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันภาวะเหงือกงอกเกิน

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน เมทฟอร์มิน

1. ยานี้เป็นยาขนานแรกที่ควรใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
2. การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
3. โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
4. ห้ามใช้ถ้ามีไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชั่วคราวกรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสี (สารทึบรังสี)

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน เมทฟอร์มิน

1. ยานี้เป็นยาขนานแรกที่ควรใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
2. การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
3. โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
4. ห้ามใช้ถ้ามีไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชั่วคราวกรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสี (สารทึบรังสี)

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน เมทฟอร์มิน

1. ยานี้เป็นยาขนานแรกที่ควรใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
2. การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
3. โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
4. ห้ามใช้ถ้ามีไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชั่วคราวกรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสี (สารทึบรังสี)

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน เมทฟอร์มิน

1. ยานี้เป็นยาขนานแรกที่ควรใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
2. การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
3. โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
4. ห้ามใช้ถ้ามีไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชั่วคราวกรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสี (สารทึบรังสี)

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน เมทฟอร์มิน

1. ยานี้เป็นยาขนานแรกที่ควรใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
2. การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
3. โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
4. ห้ามใช้ถ้ามีไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชั่วคราวกรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสี (สารทึบรังสี)

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน เมทฟอร์มิน

1. ยานี้เป็นยาขนานแรกที่ควรใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
2. การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
3. โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
4. ห้ามใช้ถ้ามีไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชั่วคราวกรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสี (สารทึบรังสี)

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน เมทฟอร์มิน

1. ยานี้เป็นยาขนานแรกที่ควรใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
2. การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
3. โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
4. ห้ามใช้ถ้ามีไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
5. ปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดใช้ยานี้ชั่วคราวกรณีต้องเอกซเรย์ด้วยการฉีดสี (สารทึบรังสี)

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน กลัยเบนคลาไมด์/กลัยพิไซด์

1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

2 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด เช่น รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

3 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง

4 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน

1. ยานี้ใช้ลดไขมันชนิดไม่ดีในเลือด ได้แก่ แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
2. ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองแล้ว
3. การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
4. ยานี้อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย ถ้าเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุควรไปพบแพทย์ทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน โคลชิซีน

1. ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการปวดเบ่ง
3. หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
4. อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน โคลชิซีน

1. ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการปวดเบ่ง
3. หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
4. อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน โคลชิซีน

1. ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการปวดเบ่ง
3. หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
4. อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน โคลชิซีน

1. ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการปวดเบ่ง
3. หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
4. อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน โคลชิซีน

1. ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการปวดเบ่ง
3. หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
4. อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน โคลชิซีน

1. ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการปวดเบ่ง
3. หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
4. อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน โคลชิซีน

1. ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่เพิ่มขนาดยาเอง เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้
2. หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการปวดเบ่ง
3. หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
4. อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อัลโลพูรินอล

1. ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
2. สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยา
3. หยุดยาทันทีถ้ามีผื่นขึ้น เป็นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
4. ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียว ไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อปี มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปุ่มนูนตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย
5. ดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันระหว่างใช้ยานี้ เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไต

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อัลโลพูรินอล

1. ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
2. สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยา
3. หยุดยาทันทีถ้ามีผื่นขึ้น เป็นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
4. ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียว ไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อปี มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปุ่มนูนตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย
5. ดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันระหว่างใช้ยานี้ เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไต

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อัลโลพูรินอล

1. ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
2. สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยา
3. หยุดยาทันทีถ้ามีผื่นขึ้น เป็นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
4. ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียว ไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อปี มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปุ่มนูนตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย
5. ดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันระหว่างใช้ยานี้ เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไต

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อัลโลพูรินอล

1. ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
2. สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยา
3. หยุดยาทันทีถ้ามีผื่นขึ้น เป็นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
4. ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียว ไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อปี มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปุ่มนูนตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย
5. ดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันระหว่างใช้ยานี้ เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไต

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อัลโลพูรินอล

1. ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
2. สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยา
3. หยุดยาทันทีถ้ามีผื่นขึ้น เป็นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
4. ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียว ไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อปี มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปุ่มนูนตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย
5. ดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันระหว่างใช้ยานี้ เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไต

ฉลากยาเสริมสำหรับประชาชน อัลโลพูรินอล

1. ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
2. สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรกของการใช้ยา
3. หยุดยาทันทีถ้ามีผื่นขึ้น เป็นไข้ ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
4. ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียว ไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อปี มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปุ่มนูนตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย
5. ดื่มน้ำ 2-3 ลิตรต่อวันระหว่างใช้ยานี้ เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไต